

LipidRescue™

THERAPIE BIJ HARTSTILSTAND VEROORZAAKT DOOR LOCALE ANESTHETICA

HOUD DEZE KAART AUB BIJ DE ZAK INTRALIPID 20%

Als er hartstilstand optreedt na het gebruik van locale anesthetica, die niet reageert op de standaard therapie, en ook met standaard cardiopulmonale reanimatie niet beheersbaar is, moet men Intralipid 20% i.v. toedienen volgens het volgende schema:

- Intralipid 20% 1,5 ml/kg in 1 minuut
- Onmiddellijk gevolgd door infuus met 0,25 ml/kg/min,
- Doorgaan met thoraxcompressies (Intralipid moet circuleren)
- Herhaal bolus na 3-5 minuten tot 3 ml/kg tot circulatie hersteld is
- Continueer infuus tot de hemodynamiek hersteld is, verhoog de infuussnelheid naar 0,5 ml/kg als de bloeddruk deelt
- De aanbevolen maximale dosis bedraagt 8 ml/kg

Voorbeeld voor reanimatie van een volwassene 70 kg:

- Neem 500 ml Intralipid 20% en een 50 ml injectiespuit
- Geef direct 2x 50 ml i.v.
- Restinfuus over 15 minuten toedienen
- Herhaal startbolus tot tweemaal toe als spontane circulatie niet terugkeert

Gaarne ieder gebruik van Intralipid bij intoxicatie met locale anesthetica melden op: www.lipidrescue.org

Versie 7/06