

# LipidRescue™

## **BEHANDLING AV LOKALANESTETIKA- INDUCERAT HJÄRTSTILLESTÅND**

(DENNA INSTRUKTION FÖRVARAS PÅ INTRALIPID-PÅSE)

---

I händelse av lokalanestetika-inducerat hjärtstillestånd som inte svarar på standardterapi, utöver sedvanlig AHLR, ges Intralipid 20% iv enligt nedanstående:

- Intralipid 20 % 1,5 ml/kg över 1 minut.
  - Direkt därpå kopplas infusion m 0,25 ml/kg/min.
  - Fortsätt hjärtkompressioner (Intralipid ska cirkuleras).
  - Upprepa bolus 1-2 gånger tills cirkulation finnes.
  - Fortsätt infusionen tills hemodynamisk stabilitet är uppnådd. Öka infusionen till 0,5 ml/kg/min om blodtrycket sjunker.
  - Rekommenderad maxdos 8 ml/kg.
- 

I praktiken – vid 70 kg vuxen patient:

- Ta en påse med 500 ml Intralipid 20 % och en 50 ml spruta.
  - Dra upp 50 ml och ge iv x 2.
  - Koppla sedan Intralipidpåsen till infusinsaggregrat och ge resten iv över 15 min.
  - Upprepa iv- bolus som mest 2 ggr ytterligare om inte ROSC.
- 

Om Intralipid används för att behandla lokalanestetika-toxicitet, var vänlig skriv rapport till

[www.lipidrescue.org](http://www.lipidrescue.org).

Kom ihåg att ersätta använd påse Intralipid (hållbarhet ca 1 år i rumstemperatur).

Giltig from 061201 tom 071231 ansvarig M Klarén

