

LipidRescue™

(SECOURS PAR LIPIDE)

TRAITEMENT POUR ARRÊT CARDIAQUE DU À UN ANESTHÉSIQUE LOCAL

S'IL VOUS PLAÎT GARDER CE PROTOCOLE ATTACHÉ À LA POCHE DES INTRALIPIDES

En cas d'arrêt cardiaque du à un anesthésique local qui ne répond pas à la thérapie standard, en plus de la réanimation cardio-pulmonaire classique, Intralipide 20% devrait être donné en intraveineux selon le régime suivant:

- Intralipide 20% 1.5 mL/kg pendant 1 minute
- Suivre immédiatement avec une infusion au débit de 0.25 mL/kg/min,
- Continuer les compressions de la poitrine (le lipide doit circuler)
- Répéter le bolus toutes les 3-5 minutes jusqu'à 3 mL/kg de dose totale et que la circulation soit rétablie
- Continuer l'infusion jusqu'à ce que la stabilité hémodynamique soit restaurée. Augmenter le débit à 0.5 mL/kg/min si la pression sanguine décline
- Dose maximale totale de 8 mL/kg est recommandée

En pratique, en réanimant un adulte pesant 70kg:

- Prendre une poche de 500ml d'Intralipide 20% et une seringue de 50ml.
- Aspirer 50ml et donner stat i.v., X2
- Ensuite attacher la poche d'Intralipide à une administration intraveineuse (macro drip) et laisser goutter pendant les 15 minutes suivantes
- Répéter le bolus initial jusqu'à deux fois plus – si la circulation spontanée n'est pas rétablie.

Si vous utilisez Intralipide pour traiter un cas de toxicité due à un anesthésique local, S'il vous plaît reportez le à www.lipidrescue.org.

Ver 7-06