

LipidRescue™

Rescate Lipidico

TRATAMIENTO PARA LA PARADA CARDIACA INDUCIDA POR ANESTESICO LOCAL

POR FAVOR MANTENGA ESTE PROTOCOLO ADJUNTO A LA BOSA DE INTRALIPID

En caso de parada cardiaca precipitada por anestesico local que no responde al tratamiento standard, a parte de la reanimacion cardiopulmonar, Intralipid 20% debe ser administrado de acuerdo con el siguiente regimen:

- Intralipid 20% 1.5 mL/kg inyeccion rapida durante 1 minuto
- Seguido inmediatamente por una infusion a 0.25 mL/kg/min,
- Continue el masaje cardiaco (el lipido tiene que circular)
- Repetir una inyeccion rapida cada 3-5 minutos llegando a los 3 mL/kg dosis total en inyeccion rapida hasta que la circulacion recomience
- Continuar la infusion hasta que se establezca estabilidad hemodinamica. Aumentar la velocidad a 0.5 mL/kg/min si la presion arterial baja
- La dosis total maxima recomendada es 8 mL/kg

En la practica, en la reanimacion de un adulto que pesa 70 Kg:

- *Coja una bolsa de 500ml de Intralipid 20% y una jeringuilla de 50 ml.*
- *Prepare 50 ml de Intralipid de la bolsa y administrela en inyeccion rapida, repita la operacion otra vez*
- *Despues introduzca un gotero en la bolsa de Intralipid y dejelo correr intravenosamente durante los proximos 15 minutos*
- *Repetir la inyeccion rapida inicial dos veces mas – si la circulacion espontanea no ha vuelto.*

Si usa Intralipid para tratar un caso de toxicidad de anestesico local por favor informenos a traves de la pagina web www.lipidrescue.org.