

LipidRescue™

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΝΑ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΣΑΚΟ INTRALIPID

Σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής που οφείλεται σε τοπικά αναισθητικά και η οποία δεν ανταποκρίνεται στην συνηθισμένη θεραπεία, παράλληλα με τη Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χορηγήστε ενδοφλεβίως Intralipid 20% στις παρακάτω δοσολογίες :

- Intralipid 20% 1,5ml/Kg σε 1 λεπτό.
- Αμέσως μετά, συνεχής έγχυση με ρυθμό 0,25ml/Kg/min.
- Συνεχίστε θωρακικές συμπίεσεις (το intralipid πρέπει να κυκλοφορήσει).
- Επαναλάβετε τις bolus δόσεις κάθε 3 – 5 λεπτά έως 3ml/Kg και μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
- Συνεχίζεται την έγχυση έως να αποκατασταθεί η αιμοδυναμική σταθερότητα. Αυξήστε την έγχυση σε 0,5ml/Kg/min εάν μειωθεί η αρτηριακή πίεση.
- Μέγιστη συνιστώμενη δόση έως 8ml/Kg.

Στην πράξη , σε ενήλικα 70Kg υπό ανάνηψη :

- *Χρειάζεστε σάκο 500ml Intralipid 20% και μια σύριγγα 50 ml.*
- *Αναρροφήστε 50ml και χορηγήστε ενδοφλεβίως X 2.*
- *Ακολούθως, προσαρμόστε συσκευή ορού στον σάκο Intralipid και χορηγήστε τον ενδοφλεβίως σε 15 λεπτά*
- *Επαναλάβετε την αρχική bolus δόση δύο ακόμα φορές – εάν δεν έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία .*

Εάν χρησιμοποιήσετε Intralipid για την αντιμετώπιση τοξικότητας από τοπικά αναισθητικά, παρακαλώ αναφέρεται το περιστατικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lipidrescue.org και βεβαιωθείτε ότι ένας νέος σάκος intralipid αντικατέστησε τον σάκο που χρησιμοποιήθηκε.

Ver: 06/07