

LipidRescue™

علاج توقف القلب الناتج عن سمية أدوية التخدير الموضعي

يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات مع كيس الـ **Intralipid**)

-
- في حال حدوث توقف للقلب بسبب سمية أدوية التخدير الموضعي، وعدم استجابة هذا التوقف للعلاج التقليدي ، يمكن بالإضافة إلى الإنعاش القلبي الرئوي التقليدي إعطاء **Intralipid 20%** عبر الطريق الوريدي وفقاً للنظام التالي:
 - إعطاء **Intralipid 20%** وريدياً بجرعة: **5.1** مل/كغ على مدة دقيقة واحدة.
 - المتابعة فوراً بالتسريب الوريدي بجرعة **25.0** مل/كغ/دقيقة.
 - الاستمرار بالتدليك الخارجي للقلب (لتأمين دوران الـ **Intralipid 20%**.)
 - تكرر الجرعة الأولية كل **3 - 5** دقائق وصولاً حتى **3** مل/كغ أو حتى عودة الدوران الدموي التلقائي.
 - متابعة التسريب الوريدي بالجرعة السابقة حتى الوصول إلى الاستقرار الدوراني. يمكن زيادة الجرعة إلى **5.0** مل/كغ/دقيقة في حال هبوط الضغط الدموي.
 - الجرعة القصوى الموصى بها هي **8** مل/كغ.

-
- من وجهة نظر عملية وفي حال إنعاش شخص بالغ يزن **70** كغ :
 - خذ كيساً من **Intralipid 20%** (سعة **500** مل وحقنة وريدية سعة **50** مل).
 - اسحب **50** مل من الكيس و أعطها وريدياً بسرعة ، مرتين.
 - قم بوصل الباقي من كيس الـ **Intralipid 20%** إلى أنبوب التسريب الوريدي و أعطه خلال الـ **15** دقيقة التالية.
 - يمكن تكرار الجرعة الأولى (**100** مل) مرتين في حال عدم عودة الدوران الدموي العفوي.

في حال قمت باستخدام الـ **Intralipid**) لعلاج حالة من التسمم بأدوية التخدير الموضعي يرجى إرسال تقرير إلى www.lipidrescue.org . لا تنس إعادة المخزون من **Intralipid**.)