

LipidRescue

TRATAMENTO PARA PARAGEM CARDÍACA INDUZIDA POR ANESTÉSICO LOCAL

POR FAVOR MANTENHA ESTE PROTOCOLO ADJACENTE À BOLSA DO INTRALIPID

Na eventualidade de paragem cardíaca induzida por anestésico local refractária às medidas terapêuticas convencionais, e em simultâneo com ressuscitação cardiopulmonar, deve iniciar o seguinte regime de Intralipid por via endovenosa:

- *Intralipid 20% 1,5ml/kg em 1 minuto*
- *Iniciar imediatamente perfusão a 0,25mg/kg/min*
- *Repetir bólus a cada 3 - 5 minutos (dose máxima de 3ml/kg) até restabelecimento da circulação*
- *Manter perfusão contínua até estabilidade hemodinâmica. Se diminuição da pressão arterial, aumentar a velocidade de perfusão para 0,5ml/kg/min*
- *Dose total máxima recomendada de 8ml/kg*

Em termos práticos, para ressuscitar um adulto com 70kg de peso:

- *Utilizar saco de 500ml de Intralipid 20% e seringa de 50ml*
- *Retirar 50ml e administrar imediatamente, por via endovenosa. Repetir.*
- *De seguida, colocar restante conteúdo do saco para administração endovenosa por meio de sistema de soro (Macrogota) para correr em 15 minutos.*
- *Repetir novamente o bólus inicial até duas vezes se não for restaurada circulação espontânea*

Se usar Intralip para tratamento de toxicidade por anestésico local, por favor relate-o em www.lipidrescue.org.

Não esquecer de repôr o lípido